

han på talerstolen efterfulgtes af *Paul Lowinger* (Detroit, U.S.A.), hvis foredrag bar titelen: «A psychiatrist in the Civil Rights Movement», et tema som fængt mer ved sin konkrete nærhet og aktualitet.

Tilstede ved møtet var mange gjester utenom Norsk Psykiatrisk Forenings medlemmer, som med Helsedirektøren i spissen deltok ivrig i debatten.

Dr. T. E. Mogstad, Rikshospitalet, Oslo.

Nord. psykiat. T. 22, 430-431 (1968).

LSD 1777 a

DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

Mødereferater

295. møde den 16. december 1967 i København

Einar Geert-Jørgensen og Mogens Hertz: Narkotikaproblemer hos hallucinogenbehandlede patienter.

Referat ikke indgået.

Psychiatrische Komplikationen bei LSD-Misbrauch
Finn Jørgensen: Psykiatriske komplikationer til LSD-misbrug.

LSD er det mest potente hallucinogen, man kender. Virkningen er dels betinget af stoffets farmakologiske virkning, dels af psykologiske og sociologiske faktorer. Fra den terapeutiske anvendelse af LSD ved man, at det hos visse patienter kan give psykotiske reaktioner, ligesom der også er beskrevet selvmord i tilslutning til anvendelsen. Det er dog først efter, at LSD er blevet misbrugt i større omfang, at sådanne komplikationer er beskrevet, spec. fra USA, hvor der i de sidste 3 år i stigende grad er blevet indlagt patienter med psykotiske reaktioner efter LSD.

I mit materiale af 100 hallucinogen-misbrugere havde 47 misbrugt LSD og blandt disse 47 udviklede 11 psykotiske reaktioner i tilslutning til misbruget. I den akutte fase havde sygdomsbilledet overvejende delirøst præg. Hovedparten af psykoserne klingede hurtigt af, men 5 tog et mere protracted forløb. Det drejer sig her om LSD-udløste endogene psykoser, overvejende skizofreni. I et enkelt tilfælde opblussen af psykotiske symptomer flere måneder efter misbrugets ophør.

De psykotiske reaktioner opstår således hos i forvejen psykopatologiske personer. Det kan dreje sig om aktivering af endogene psykoser samt udløsning af relativt kortvarige psykoser hos jeg-svage personer som f.eks. karakterafvigere og psykopater. De LSD-udløste psykoser adskiller sig ikke

fænomenologisk fra nabis og meskalin.

Længerevarende derigennem personatiske træk hos m

Diskussion:

Thomas Olsen: Vi ste 1 1/2 år indlagte u år: 3. 8 var fra mid vækstforhold: betegne Forældre: psykisk afv malt ydre forløb 5, h mange skoleskift. Afb og 1 står foran skilsm identifikationsproblem politiet, 6 i relation t

Misbrugets art: has tamin, ritalin, opiater (dom 1, borneværn 2

Materialet repræse dominans af egentlig gende opvækstforhold

M. Hertel Wulff: N hos LSD-misbrugere. ledet var ejendommel fjernhedstilstand, hvor gerede ejendommeligt stande, hvor patienten af »LSD-psykosere« bo

Erling Jacobsen: Ps brug af LSD, hash og form for komplikation. fer muliggør ændringe overladt til sig selv m tagelser, der kan være vendelse af LSD gives virkning af deres LSD. der var uhensigtsmæss gelse af en social posit Sådanne forhold må i i øvrigt også hvis en l psykoterapeutisk kontak skade, da den i visse t rede forelagt tilfælde i handling, og også i R. årelang, meget svær o

K. Nørgaard: Mene kunne dreje sig om en tilstand.

Erling Jacobsen: til

etroit, U.S.A.), hvis
hts Movements», et
alitet.

Psykiatrisk Forenings
ivrig i debatten.

Rikshospitalet, Oslo.

LSD 1777 a

B

enbavn

problemer hos hal-

Gen. LSD-tilsætning
misbrug.

Virkningen er dels
kologiske og socio-
D ved man, at det
om der også er be-
først efter, at LSD
tioner er beskrevet,
d er blevet indlagt

47 misbrugt LSD
tilslutning til mis-
ende delirøst præg.
tog et mere prota-
ene psykoser, over-
kotske symptomer

n psykopatologiske
psykoser samt ud-
ersoner som f. eks.
adskiller sig ikke

fænomenologisk fra psykoser udløst af andre hallucinogener som f. eks. cannabis og meskalin.

Længerevarende LSD-misbrug vil medføre en betydelig jeg-svækkelse og derigennem personlighedsændring, således at der ses neurotiske og psykopatiske træk hos misbrugere.

Diskussion:

Thomas Olsen: Vi har erfaring fra 10 i mandshospitalet i Risskov gennem de sidste 1½ år indlagte unge misbrugere. Alder ved abususbegyndelse 14-18 år: 7, 20-28 år: 3. 8 var fra middelklassehjem, heraf 4 akademikere, 2 fra arbejderhjem. Opvækstforhold: betegnet for 4 som gode, for 6 som udpræget dårlige, ofte skilsmisse. Forældre: psykisk afvigende hos 6, heraf psykose 4, uoplyst hos 3. Skolegang: normalt ydre forløb 5, heraf 2 med studentereksamen, 2 med realeksamen. 4 har haft mange skoleskift. Afbrudt uddannelse 2, ingen uddannelse 8. 3 gifte, heraf 2 skilte og 1 står foran skilsmisse. 9 præmorbidt afvigende, alle normalt begavede. Seksuelle identifikationsproblemer: 4 (enkeltstående homoseksuelle oplevelser). 9 var kendt af politiet, 6 i relation til narkotikaloven, 3 straffelovskriminalitet.

Misbrugets art: hash alene 1, hash + LSD 1, efedrin 1, hash + LSD + amfetamin, ritalin, opiat og derivater heraf 7. Indlæggelsesmåde frivillig 5, tvang 5 (dom 1, børneværn 2).

Materialet repræsenterer »de tungeste«. Klar overvægt af blandet misbrug med dominans af egentlig klassiske narkotika. Flertallet præmorbidt afvigende med afvigende opvækstforhold og psykiatrisk disposition. Halvdelen søgte selv behandling.

M. Hertel Wulff: Man må være forsigtig med at rubricere de psykotiske tilstande hos LSD-misbrugere. En af de refererede patienter var indlagt hos os. Tilstandsbilledet var ejendommeligt med bratte svingninger fra en ret normal tilstand til en fjernhedstilstand, hvor patienten næppe var egentlig bevidsthedssvækket, men reagerede ejendommeligt trægt. Der var fuld sygdomserkendelse for disse abnormtilstande, hvor patienten følte, at tankevirksomheden foregik meget langsomt. Tilfælde af »LSD-psykoser« bør beskrives meget nøje.

Erling Jacobsen: Psykoser og suicidium er de mest omtalte komplikationer til misbrug af LSD, hash og lign. De rammer kun et mindretal, og formentlig er en anden form for komplikationer af større praktisk betydning. Den opstår ved, at disse stoffer muliggør ændringer i den vanlige karakterstruktur, og at et menneske, der er overladt til sig selv m. h. t. at bygge en ny karakter op, regelmæssigt vil begå fejltagelser, der kan være af temmelig skæbnesvanger natur. Fra den terapeutiske anvendelse af LSD gives en række kliniske eksempler på, hvordan patienter under indvirkning af deres LSD-oplevelser har stået i begreb med at kaste sig ud i reaktioner, der var uhensigtsmæssige og kunne medføre f. eks. et brudt ægteskab eller ødelæggelse af en social position. Specielt spiller masochistiske manøvrer en stor rolle heri. Sådanne forhold må i høj grad gøre sig gældende ved ukontrolleret misbrug, men i øvrigt også hvis en behandling med LSD gennemføres lægeligt uden tilstrækkelig psykotерапевtisk kontakt. Sådanne tilfælde vil bringe LSD-behandling i miskredit til skade, da den i visse tilfælde kan være overordentlig værdifuld. Der er f. eks. allerede forelagt tilfælde af svære tvangsneuroser, der har vist sig tilgængelige for behandling, og også i Risskov har vi opnået total helbredelse af en patient med en årslang, meget svær og helt invaliderende tvangsneurose.

K. Nørgaard: Mener, at et af Erling Jacobsens tilfælde af tvangsneurose muligvis kunne dreje sig om en pseudo-neurotisk skizofreni eller en lignende grænsepsykotisk tilstand.

Erling Jacobsen: til Nørgaard: mener ikke, der kunne være tvivl om diagnosen.